

CARGA DE ENFERMEDAD EN ESPAÑA EN EL AÑO 2000

LAS DESIGUALDADES DE SALUD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Ricard Gènova-Maleras^{1,2}, Elena Alvarez-Martín², Consuelo Morant-Ginestar²


(1) Instituto de Salud Pública, Dirección General de Salud Pública y Alimentación-Comunidad de Madrid)

(2) Departamento de Salud Internacional, Escuela Nacional de Sanidad-Madrid [correspondencia: ricard.genova@salud.madrid.org]


Antecedentes: Los indicadores de mortalidad se han utilizado habitualmente para expresar el estado y las desigualdades de salud. Los Estudios de Carga de Enfermedad (CdE) incorporan las consecuencias no mortales de las lesiones y enfermedades y son potencialmente útiles para evidenciar las desigualdades de salud entre mujeres y hombres en una población.

Objetivo: estimar la Carga de Enfermedad de España para el año 2000 y analizar a partir de los resultados obtenidos las desigualdades de salud entre las mujeres y los varones de la población española.

Resultados:



España. Año 2000. 10 primeras causas de Carga de Enfermedad (AVAD)
Años de Vida Perdidos por Muerte (AVP) y Años Vividos con Discapacidad (AVD), por sexo



Conclusiones:

- En España 2000 los hombres soportan una Carga Global de Enfermedad (AVAD) algo mayor (54,7%) que las mujeres (45,3%).
- Sin embargo, al descomponer este indicador se aprecia (1) que **la discapacidad y mala salud (AVD) es mayor en las mujeres que en los hombres**, y (2) que **en las mujeres el peso de la discapacidad es mucho mayor que el de la mortalidad**.
- De las 5 primeras causas de Carga de Enfermedad, en 4 (Demencias, Depresión, Enf. Osteomusculares, Enf. de Órganos de los Sentidos) las mujeres suman más AVADs que los hombres. En ellas, la discapacidad es mucho mayor que la mortalidad.
- Estos resultados son consistentes con las Encuestas de Salud y Encuestas de Discapacidad, que recogen un peor estado de salud en las mujeres, a pesar de su mayor esperanza de vida (82,8 años al nacer, por 76,1 en hombres (INE)).
- Las desigualdades de salud entre mujeres y hombres se valoran de modo muy distinto según se midan con indicadores de mortalidad o de Carga de Enfermedad.
- Al tener en cuenta también las consecuencias no mortales de las enfermedades y lesiones, los estudios de Carga de Enfermedad muestran más claramente los problemas de salud de la población femenina.